

GORBAN®

Vista rápida del producto

GORBAN® es un quimioterapéutico bactericida inyectable de amplio espectro y acción prolongada para su uso en bovinos, equinos, ovinos, cerdos, perros y gatos.

Vista general

Quimioterapéutico bactericida inyectable de amplio espectro y acción prolongada.

GORBAN®

Solución inyectable

Reg. SAGARPA Q-0273-137

GORBAN® es un quimioterapéutico bactericida inyectable de amplio espectro y acción prolongada para su uso en bovinos, equinos, ovinos, cerdos, perros y gatos.

Infecciones respiratorias, digestivas, de la glándula mamaria, genitourinarias, del aparato locomotor, septicémicas, etcétera, producidas por microorganismos sensibles a los componentes de la fórmula.

La combinación de ambos principios activos ejerce una acción sinérgica y bactericida al impedir la síntesis del ácido fólico, esencial para el metabolismo bacteriano.

GORBAN® tiene eficacia contra *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Pasteurella spp*, *Salmonella spp*, *Proteus, spp*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp*, *Brucella spp*, *Vibrio spp*, *Pseudomona spp*, *Leptospira spp*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bordetella bronchiseptica*, etcétera.

COMPOSICIÓN FÓRMULA:

Cada ml contiene: Trimetoprim 40 mg. Sulfadoxina 200 mg. Vehículo, c. b. p. 1 ml.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

En la mayoría de los casos basta una sola dosis de GORBAN®, debido a su acción bactericida prolongada. Si por la gravedad de la infección no se obtiene el éxito terapéutico deseado o resultara insuficiente, debe repetirse la misma dosis 48 horas después de la primera.

La dosis es de 3 ml/50 kg de peso en todas las especies indicadas, lo que equivale a la siguiente dosificación según el peso del animal:

Especie	Dosis
Bovinos y equinos adultos (300-500 kg)	20-30 ml
Novillos y potros	5-15 ml
Terneros y potrillos	3-5 ml
Cerdas de cría	8-12 ml
Cerdos destetados-crecimiento	1-3 ml
Cerdos finalización	5-8 ml
Lechones	0.5-1 ml
Ovejas	3 ml
Corderos	0.5 ml

Especie	Vía de administración
Bovinos, porcinos y ovinos	Intramuscular, subcutánea o endovenosa.
Equinos	Endovenosa o intramuscular.

Perros	Subcutánea o endovenosa.
Gatos	Subcutánea o intramuscular.

PRECAUCIONES

Consérvese en un lugar fresco.

PERÍODO DE RETIRO:

1. No se use 8 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
2. No consuma leche durante ni después de los 2 días posteriores a su aplicación.