

NAFPENZAL® DC

Vista rápida del producto

NAFPENZAL® DC es una suspensión antibiótica intramamaria de amplio espectro y larga acción.

Vista general

Antibiótico intramamario de amplio espectro y larga duración

NAFPENZAL® DC

Suspensión intramamaria

Reg. SAGARPA Q-0273-085

NAFPENZAL® DC es una suspensión antibiótica intramamaria de amplio espectro y larga acción para el tratamiento y prevención de la mastitis subclínica bovina durante el periodo seco mediante el método clásico (8 semanas).

COMPOSICIÓN FÓRMULA:

Cada jeringa contiene: Penicilina procaínica 300 mg. Dihidroestreptomicina 100 mg. Nafcilina 100 mg. Excipiente, c. b. p. 3 g.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Aplique una jeringa por infusión en cada uno de los cuartos al inicio del periodo seco.

PRECAUCIONES

1. Desinfecte el pezón antes del tratamiento.
2. Retire el tapón protector hasta el momento de la administración.
3. No ordeñe a la vaca durante el periodo seco una vez que el producto haya sido administrado.
4. Consérvese en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS:

1. No combine con antibióticos antagónicos a la fórmula.
2. No aplique en animales con hipersensibilidad a los antibióticos betalactámicos.

Leche: Si el intervalo entre el tratamiento y el parto es ≥ 42 días, el periodo de retiro será de 3 ordeñas (36 horas) posteriores al parto. Si el intervalo entre el tratamiento y el parto es < 42 días, la leche deberá ser analizada para la detección de residuos de antibióticos antes de su entrega.

Tejidos: 14 días después del tratamiento.