

## **NAQUASONE®**

### **Vista rápida del producto**

Diurético y antiinflamatorio. Reduce los efectos del edema postparto.

### **Vista general**

Diurético antiinflamatorio

NAQUASONE®

Solución inyectable

Reg. SAGARPA Q-0273-038

NAQUASONE® provee una combinación única de actividad diurética y antiinflamatoria con sus ingredientes activos triclorometiazida y dexametasona. Reduce los efectos clínicos del edema postparto como dolor e inflamación.

Restaura la circulación normal de la ubre en tan sólo 48 horas. Estimula el apetito en estadios de anorexia. Fácil y práctica dosificación.

20% más capacidad antiinflamatoria que la prednisolona.

Cuida el balance electrolítico del animal. A las dosis recomendadas no causa retención de sodio.

### **COMPOSICIÓN FÓRMULA:**

Cada ml contiene: Triclorometiazida 10 mg. Dexametasona 0.5 mg. Vehículo, c. b. p. 1 ml.

### **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:**

Antes, durante o inmediatamente después del parto inyectar 20 ml vía I.M., repetir a las 12 y 36 horas.

Los resultados comenzarán a observarse dentro de las 24 a 48 horas después del inicio del tratamiento. Si los resultados no son evidentes a los 3 días, se recomienda que se reexamine al animal.

### **PRECAUCIONES**

**PERÍODO DE RETIRO:** No deberá usarse este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. La leche de las vacas tratadas no debe utilizarse para consumo humano, hasta después de 2 días de la aplicación de este producto.