

## FICHA TÉCNICA

### BOBACT 8®

Reg. SAGARPA B-0273-111

#### USO VETERINARIO

1

#### BACTERINA POLIVALENTE (8 VÍAS) Y TOXOIDE PARA LA INMUNIZACIÓN DE BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS

##### FÓRMULA:

Cada ml contiene células completas inactivadas y toxoide de:

<i>Clostridium chauvoei</i>	10 <sup>7</sup> UFC
<i>Clostridium septicum</i>	10 <sup>6</sup> UFC
<i>Clostridium novyi</i>	10 <sup>6</sup> UFC
<i>Clostridium sordelli</i>	10 <sup>6</sup> UFC
<i>Clostridium perfringens</i> serotipo C y D	10 <sup>6</sup> UFC
<i>Pasteurella multocida</i> serotipo A y D	10 <sup>7</sup> UFC
<i>Mannheimia (Pasteurella) haemolytica</i>	10 <sup>7</sup> UFC
Vehículo c.b.p	1 ml

##### DESCRIPCIÓN:

**Bobact 8®** es una bacterina que contiene los antígenos concentrados de *M. haemolytica* tipo A1, *P. multocida* A y D, *C. chauvoei*, *C. sordelli* y los toxoides de *C. septicum*, *C. novyi* y *C. perfringens* tipo C y D en hidróxido de aluminio como adyuvante para incrementar la estimulación del sistema inmune.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de ganado sano como auxiliar en la prevención del carbón sintomático, el edema maligno, la hepatitis necrótica infecciosa, la enterotoxemia, el riñon pulposo y la neumonía enzoótica en bovinos, ovinos y caprinos.

##### ESPECIES DESTINO:

Bovinos, ovinos y caprinos.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Bacterina-toxoide inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: Aplique 5 ml por vía subcutánea o intramuscular.

Ovinos y caprinos: Aplique 2.5 ml por vía subcutánea o intramuscular.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Aplíquese a partir de los 3 meses de edad, realice una aplicación de refuerzo a las 3 o 4 semanas. Se recomienda la revacunación cada 6 meses o antes de cualquier manejo que aumente el estrés de los animales.

#### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agítese bien antes de usar.
- Evite su contaminación.
- Utilice jeringas y agujas estériles.
- Antes de administrar, permita que el producto alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).

2

#### CONTRAINDICACIONES:

No vacunar animales enfermos o animales que puedan ser afectados por enfermedades subclínicas, estrés o inmunodeprimidos

#### REACCIONES ADVERSAS:

Se pueden presentar reacciones anafilácticas y una ligera reacción inflamatoria transitoria en el sitio de aplicación.

#### ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### ***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

##### ***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

##### ***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

En caso de presentar reacciones anafilácticas se debe administrar epinefrina.

##### ***Incompatibilidades:***

No se conocen incompatibilidades. No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

##### ***Precauciones de Almacenamiento:***

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar.

Protéjase de la luz.

Una vez abierto el frasco, utilice todo el contenido. No emplear el sobrante para aplicaciones posteriores.

#### PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

#### PRESENTACIONES:

Frascos con 50 ml.

Frascos con 250 ml.

#### PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.



**INFORMACIÓN ADICIONAL:  
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

HECHO EN MÉXICO PARA:  
**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.

3