

## FICHA TÉCNICA

### BOVILIS® D

Reg. SAGARPA B-0273-261

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA A VIRUS INACTIVADO Y CLONADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA RABIA

##### FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL contiene:

Cultivo del virus de la rabia, clonado de la cepa Pasteur RIV PTA78	un mínimo de 10 TCID <sub>50</sub> (≥ 2.0 U.I. de valor antigénico)
Vehículo c.b.p	1 dosis

##### DESCRIPCIÓN:

**Bovilis® D** vacuna inactivada que contiene el virus de la Rabia cepa clonada Pasteur RIV PTA78. El virus se replica en líneas celulares BHK, Clone CT y se inactiva con β propiolactona, se presenta en suspensión acuosa y como adyuvante se emplea el fosfato de aluminio para estimular en mayor grado la respuesta inmune.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de bovinos, equinos, ovinos y caprinos contra la rabia parálitica (Derriengue).

##### ESPECIES DESTINO:

Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml por vía subcutánea o intramuscular.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Aplicarse a partir de los 3 meses de edad, realice una aplicación de refuerzo a los 6 meses. Se recomienda la revacunación anual.

**Inicio de la inmunidad:** A las 3 o 4 semanas de aplicada la vacuna ya se pueden observar niveles altos de anticuerpos circulantes, seguido por niveles constantes y suficientes para dar protección al animal.

##### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agítese bien antes de usar.
- Evite su contaminación.
- Utilice jeringas y agujas estériles.

**CONTRAINDICACIONES:**

Ninguna.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Se puede presentar una ligera reacción inflamatoria transitoria en el sitio de aplicación.

2

**ADVERTENCIAS:**

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

En caso de presentar reacciones anafilácticas se debe administrar epinefrina.

***Incompatibilidades:***

No se conocen incompatibilidades. No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar.

**PERIODO DE RETIRO:**

Cero días.

**PRESENTACIONES:**

Frascos con 10 ml.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

**ELABORADO POR:**

**Intervet International B.V.**

Wim de Körverstraat 35,

Boxmeer, Holanda.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.