



## FICHA TÉCNICA

### ShutOut

Reg. Q-0273-260

**USO VETERINARIO**



1

#### FÓRMULA:

**Cada jeringa de 4 g contiene:**  
Subnitrato de bismuto..... 2.6 g  
(equivalente a 1.9 g de Bismuto)  
Excipiente c.b.p..... 4g.

**DESCRIPCIÓN:** Suspensión intramamaria (blanca a amarillenta).

**INDICACIONES:** Prevención de nuevas infecciones intramamarias durante el periodo seco. En vacas consideradas libres de mastitis (subclínicas y clínicas), el producto puede ser usado por si solo en el manejo de vacas al momento del secado.

**ESPECIES DESTINO:** Bovinos Productores de Leche

**FORMA FARMACÉUTICA:** Suspensión intramamaria

Es una sustancia inerte que no se absorbe del sitio de aplicación (Conducto del pezón)



**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** 1 jeringa por cada pezón (Dosis única en cada periodo seco)

2

**CONTRAINDICACIONES:** No usar el producto por si solo en vacas con mastitis sub-clínica o clínica al momento del secado

NO usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

**REACCIONES ADVERSAS:** Ninguna conocida

**ADVERTENCIAS:** Es importante utilizar una técnica aséptica estricta para la administración de este producto. El producto no tiene actividad antimicrobiana.

No administrar otro producto intramamario después de administrar ShutOut, en caso necesario retirar primero el sellador interno.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

*Precauciones para su uso en animales: Es una buena práctica observar regularmente a los animales durante el periodo seco, para identificar signos de mastitis clínica. Si el cuarto sellado desarrolla mastitis, se debe retirar el sellador, previo a iniciar con una terapia de tratamiento.*

*Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales: Evite el contacto con piel y ojos, en caso de contacto lavar el área con abundante agua. Evitar el uso de este producto si es alérgico a sales de bismuto.*

*Si se desarrollan síntomas después de la exposición, buscar atención médica y mostrar el inserto o etiqueta al médico. Lavar las manos después de usar.*

*Gestación, lactancia y fertilidad: El producto no es absorbido después de la infusión intramamaria, puede ser usado en animales preñados. Al momento del parto, el sello puede ser ingerido por el ternero. La ingestión del producto por el ternero es seguro y no produce efectos adversos.*

*Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:*

*Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

*Incompatibilidades:*

*Precauciones de Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.*

**PERIODO DE RETIRO:** Carne: 0 días Leche: 0 días

**PRESENTACIONES:** Estuche con 24 jeringas

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**



3

**INFORMACIÓN ADICIONAL:  
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

ELABORADO POR:  
Intervet International GmbH  
Feldestrasse 1<sup>a</sup> D-85716  
Unterschleißheim, Alemania.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
Importado y distribuido por:  
Intervet México S.A. de C.V.  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.  
[www.msd-salud-animal.com.mx](http://www.msd-salud-animal.com.mx)