

FICHA TÉCNICA

Bovilis® Vista L5 SQ

Reg. SAGARPA B-0273-298
USO VETERINARIO

1

BACTERINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEPTOSPIROSIS BOVINA CAUSADA POR: LEPTOSPIRA CANICOLA, GRIPPOTYPHOSA, HARDJO, ICTEROHAEMORRHAGIAE Y POMONA

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

| | |
|-------------------------------|----------|
| <i>Leptospira canicola</i> | RP ≥ 1.2 |
| <i>L. grippotyphosa</i> | RP ≥ 1.2 |
| <i>L. hardjo</i> | RP ≥ 1.1 |
| <i>L. icterohaemorrhagiae</i> | RP ≥ 1.3 |
| <i>L. Pomona</i> | RP ≥ 1.0 |
| Vehículo c.b.p. | 2 ml |

*RP= Potencia Relativa



DESCRIPCIÓN:

Bovilis® Vista L5 SQ es una bacterina, que contiene cultivos de *Leptospira canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae* y *L. Pomona* con un adyuvante patentado.

INDICACIONES:

Bovilis Vista L5 SQ está indicada para la vacunación de vacas y vaquillas sanas de 6 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de la leptospirosis causada por *Leptospira canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo* incluyendo la *L. borgpetersenii* serovariedad *hardjo bovis*, *L. icterohaemorrhagiae* y *L. Pomona*.

Se ha demostrado su eficacia contra la excreción renal de organismos *L. hardjo*, incluyendo *hardjo bovis*.

ESPECIES DESTINO:

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Bacterina en suspensión acuosa inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía subcutánea.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Se recomienda iniciar la vacunación a una edad temprana para prevenir la colonización renal por *L. hardjo*, así como la revacunación anual. Sin embargo, para la revacunación se puede administrar una dosis a intervalos más frecuentes basados en la evaluación de riesgo u otras condiciones de epidemia que existen o son reportadas en cada explotación. Para más información sobre la frecuencia de revacunación consulte a su veterinario.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agite bien antes de usar.
- Evite su contaminación.
- Utilice jeringas y agujas estériles para su aplicación, la inyección debe efectuarse en un área de piel limpia y seca, tomando las debidas precauciones para evitar la contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

Reacciones locales en el lugar de la inyección son frecuentes, pero se limitan a una ligera hinchazón (<2 cm de diámetro), que desaparece dentro de las 24 a 48 horas después de la inyección. En caso de reacciones de hipersensibilidad (choque), el tratamiento adecuado será la administración de epinefrina.

ADVERTENCIAS:

Contiene timerosal como conservador.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Seguro para su uso en animales preñados.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se conocen.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Igual que si se tratase de una dosis única (reacciones adversas).

Incompatibilidades:

No se conocen incompatibilidades. No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 7°C.

No congelar.

Una vez abierto el envase, utilizar de inmediato.

Deseche el frasco y remanente de vacuna mediante incineración.

PERIODO DE RETIRO:

21 días previos al sacrificio

PRESENTACIONES:

Frascos con 100 ml (50 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

ELABORADO POR:

Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
P.O. Box 318, Millsboro,
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México