

CLUB GANADERO®



La guía esencial para desparasitar ganado bovino

Diseña tu calendario de desparasitación



Los animales con parásitos emiten más gases de efecto invernadero debido a la baja eficiencia alimenticia y sufren malestar continuo, devaluando su productividad y calidad de vida.

Los parásitos internos (helminthos, protozoos) y externos (garrapatas, piojos, moscas) **reducen el consumo de alimento, frenan el crecimiento, afectan la producción de carne y leche, y debilitan la inmunidad animal.**

Además, liberan huevos al ambiente, aumentando la carga parasitaria si no se controla correctamente.



Parásitos más comunes del ganado

Las garrapatas afectan al 80 % del ganado mundial, causando y transmitiendo enfermedades, a la vez que generan estrés crónico y anemia.

Los parásitos viven y se alimentan a expensas de un **hospedador más grande, causándole graves daños. Se dividen en dos grupos:**

CLUB GANADERO®



Internos o endoparásitos



Nematodos gastrointestinales: *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Oesophagostomum spp.*

Provocan disminución del peso corporal, diarrea en becerros, reducción de la producción de leche e ineficiencia reproductiva en las vacas.

Externos o ectoparásitos




Moscas: de la cara, del cuerno, del establo, domésticas y larvas de la mosca Berne.

Causan irritación en la piel, así también la pérdida de sangre, disminución de la ganancia de peso y baja en la producción de leche.

CLUB GANADERO®





Nematodos pulmonares como *Dictyocaulus viviparus*

Afectan las vías respiratorias causando secreción nasal, tos y dificultad para respirar, en animales jóvenes y adultos.

Gusanos planos o cestodos como *Moniezia spp.*

Ocasiona descenso del peso corporal, retraso en el crecimiento y pérdida de productividad.

Protozoarios como *Cryptosporidium parvum*.

Una de las principales causas de la diarrea neonatal bovina.

Piojos: *Linognathus vitulli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus* y *Damalinia bovis*

Provocan trastornos como anemia y transmisión de enfermedades.

Ácaros: *Sarcoptes scabiei*, *Demodex canis*, *Psoroptes bovis* y *Chorioptes bovis*.

Producen lesiones costrosas y sarna en la piel, pueden esparcirse rápidamente.

Garrapatas duras y blandas: *Boophilus spp.*, *Amblyomma spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Sarcoptes spp.*

Generan daño en la piel que afecta su venta, pérdidas en la producción y diseminación de enfermedades como anaplasmosis y piroplasmosis.

CLUB GANADERO®





Herramientas de diagnóstico clave

Cuando existe sospecha de parasitosis, lo más recomendable es apoyarte en tu MVZ para obtener un diagnóstico certero, que puede incluir:



Conteo de huevos

Conteo de huevos por gramo de heces (HPG) antes y después del tratamiento.



Recuento diferencial

Para identificar especies y carga parasitaria.



Protocolos periódicos

Especialmente en otoño/invierno.



Cepillado, exámenes con cinta y raspados

(para ubicar ectoparásitos).

Cómo iniciar un programa de desparasitación

Un programa de desparasitación busca **maximizar las ganancias productivas** y **minimizar el riesgo de enfermedades parasitarias**, tomando en cuenta:

Tipo de producción	Edad de los animales	Sexo y estado fisiológico del animal
Raza	Condiciones de alimentación	Condiciones climáticas

CLUB GANADERO®



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved
Consulte a su médico veterinario / Para reportes de eventos adversos por favor contactar a farmacovet@merck.com



Cuándo comenzar a desparasitar



Etapas de desparasitación

Etapas de desparasitación

Etapas de desparasitación

Comienza desde el ternero: aplicar cada 1 a 2 meses durante los primeros 6 meses.

Etapas de desparasitación

Después de 1-2 años, espaciar semestralmente, con tratamiento especial en el secado para vacas lecheras.

Monitoreo continuo

Realiza análisis coproparasitológicos y conteo de huevos (HPG) antes y después de desparasitar, lleva registros y monitorea para medir la efectividad.



Beneficios reales de desparasitar el ganado

- Hasta **+20–30% en producción de leche y mayor ganancia de peso** en animales sin parásitos.
- **Ahorro de costos** en tratamientos veterinarios y mejoras en la productividad.
- **Aumento del bienestar animal:** reducción de estrés, anemia, dermatitis y diarrea.

CLUB GANADERO®



Buenas prácticas para un programa eficaz

Uso racional de antiparasitarios:

Aplicar sólo cuando sea necesario, con dosificación exacta (peso real).

Rotación de principios activos:

Evita la resistencia cambiando los productos, dosificando adecuadamente (con base en el peso) y aplicándolos en los momentos más adecuados.

Control integral:



- **Manejo de pasturas:** rotación, evitar sobrepastoreo.
- Buen estado nutricional para reforzar el sistema inmunológico.
- Limpieza de corrales y bebederos para minimizar larvas e infección por moscas.


Antiparasitarios disponibles de Club Ganadero

Todos los tratamientos deben utilizarse **bajo supervisión de tu MVZ**, con base en un calendario de desparasitación específico. Si deseas adquirir algún producto, acude con tu distribuidor autorizado.

Producto	Tipo	Característica clave	Imagen
<u>Taktic®</u> (Reg. CICOPLAFEST RSCO-PEC-INAC-0119-366-009-003)	Tópico	Control de garrapatas y piojos.	
<u>Solution® 3.5% L.A.</u> (reg. SAGARPA Q-0273-025)	Inyectable	Larga acción contra endoparásitos.	
<u>Exzolt® 5% Pour On</u> (Reg. Q-0273-255)	Pour-on	Hasta 70 días de protección externa contra garrapatas.	
<u>Butox®</u> (Reg. CICOPLAFEST: RSCO-PEC-INAC-0179-327-008-013)	Inmersión y aspersión	Actúa como garrapaticida y acaricida.	
<u>Panacur® granulado al 22%</u> (Reg. Q-0273-160)	Antihelmíntico oral	Ovicida, larvicida y vermícida que se mezcla con el alimento.	
<u>Tick Gard®</u> (Reg. Q-0273-249)	Pour-on	Actúa contra garrapatas y moscas del cuerno.	

CLUB GANADERO®





Conoce más estrategias de control de parásitos en el **blog** especializado y descubre los beneficios del **programa ParasitOFF** para mantener a tu ganado sano y productivo.

CLUB GANADERO®

